

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品		使用前には必ず添付文書を読んで下さい
1	名称	ニコチネル パッチ20 、 ニコチネル パッチ10
2	成分・分量	ニコチネル パッチ20 (1枚(20cm ²)中) ニコチン 35mg ニコチネル パッチ10 (1枚(10cm ²)中) ニコチン 17.5mg
3	用法・用量	最初の6週間はニコチネル パッチ20を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付し、次の2週間はニコチネル パッチ10を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付する。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり、禁煙を続ける意志が強く、禁煙を続けられる自信がある場合には、6週間のニコチネル パッチ20を使用後、7週目以降のニコチネル パッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもかまいません。貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付する。 ○内袋をハサミで切って開封してください。 ○本剤を切って使用しないでください。 ○使用後は粘着面を内側に2つに折り、小児の手の届かない所に捨ててください。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。 (1)非喫煙者 (2)他のニコチン含有する製剤を使用している人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)授乳中の人 (5)重い心臓病を有する人 ○3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ○重い狭心症・不整脈と医師に診断された人 (6)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人 (7)うつ病と診断されたことのある人 (8)本剤の成分によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。 ; 湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>3. 本剤を一度に2枚以上使用しないでください。</p> <p>4. 本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。 (1)ニコチンガム製剤の使用 (2)喫煙</p> <p>5. 本剤を使用中は、サウナの使用や激しい運動はしないでください。</p> <p>次に該当する人はご相談ください。 ○医師の治療を受けている人 ○他の薬を使用している人 ○本人又は家族がアレルギー体質の人 ○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ○高齢者及び20才未満の人 ○発熱のある人 ○心臓病(心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全等)、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、肝臓病、腎臓病、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(パージャージャー病等)、全身性皮ふ疾患(アトピー性皮ふ炎、湿疹性皮ふ炎)、てんかん、神経筋接合部疾患(重症筋無力症、イートン・ランバート症候群)の診断を受けた人</p> <p>ニコチン過量に伴う症状(はきけやめまいなど)や、皮ふ症状(かぶれ、かゆみ、色素沈着、痛みなど)が生じた場合には、本剤をはがし、石けんなどを使わずに皮ふ表面を水で洗い乾燥させて下さい。それでも症状が続く場合は医師又は薬剤師にご相談下さい。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。