

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ボルタレンACテープL
2	成分・分量	(膏体100g中) ジクロフェナクナトリウム 1g
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼ってください。 ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2)ぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3)妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(4)15才未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1)目の周囲、粘膜等</p> <p>(2)湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。</p> <p>4. 連続して2週間以上使用しないでください。</p> <p>次に該当する人はご相談ください。</p> <p>○医師の治療を受けている人</p> <p>○他の医薬品を使用している人</p> <p>○本人又は家族がアレルギー体質の人</p> <p>○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>○テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人</p> <p>○高齢者</p> <p>○消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザの診断を受けた人</p> <p>○ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤の投与を受けている人</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。