

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ザジテンAL点眼薬
2	成分・分量	(100mL中) ケトチフェンフマル酸塩 69mg (ケトチフェンとして50mg)
3	用法・用量	1回1～2滴、1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)点眼してください。 ○目のまわりがかゆくなることがありますので、目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。 ○まぶたやまつ毛に触れないように点眼してください。また、混濁したものは使用しないでください。 ○コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和： 目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、 異物感(コロコロする感じ)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)1才未満の小児 2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。) 次に該当する人はご相談ください。 ○医師の治療を受けている人 ○減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人 ○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ○妊婦又は妊娠していると思われる人 ○次の症状のある人：はげしい目の痛み ○アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人 次のような場合は、アレルギーによるものとは断定できないため、医師にご相談ください。 ・片方の目だけに症状がある場合 ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合 ・視力にも影響がある場合 ・目やにの多い場合 使用中に目の周囲などにひどいかゆみ、はれなどの症状があらわれた場合や、1週間位使用しても症状がよくなる場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。