

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ラミシールプラススプレー
2	成分・分量	(100g中) テルビナフィン塩酸塩 1g、クロタミトン 5g、グリチルレチン酸 0.5g、 l-メントール 2g
3	用法・用量	1日1回、適量を患部に噴霧してください。 ○本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。 ○目に入らないように注意してください。
4	効能・効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 本剤による過敏症(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人は使用しないでください。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください (1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2)湿疹 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部</p> <p>次に該当する人はご相談ください。 ○医師の治療を受けている人 ○妊婦又は妊娠している可能性のある人 ○乳幼児 ○本人又は家族がアレルギー体質の人 ○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ○患部が顔面又は広範囲の人 ○患部が化膿している人 ○「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。