

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニコチネル フルーツ
2	成分・分量	(1個中) ニコチン 2mg
3	用法・用量	<p>タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個をゆっくりと間をおきながら、30～60分間かけてかみます。1日の使用個数は下記を目安とし、通常、1日4～12個から始めて適宜増減しますが、1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら(1カ月前後)、1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし、1日の使用個数が1～2個となった段階で使用をやめます。なお、使用期間は3カ月をめどとします。</p> <p>○使用開始時の1日の使用個数の目安(禁煙前の1日の喫煙本数/1日の使用個数) 20本以下/4～6個、21～30本/6～9個、31本以上/9～12個</p> <p>○タバコを吸うのを完全に止めて使用してください。 ○1回に2個以上かまないでください。 ○本剤が入れ歯などに付着し、脱落・損傷を起こすことがあります。</p>
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。 (1)非喫煙者 (2)すでに他のニコチン製剤を使用している人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)重い心臓病を有する人 ○3カ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ○重い狭心症・不整脈と医師に診断された人 (5)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人 (6)うつ病と診断されたことのある人 (7)あごの関節に障害がある人 (8)本剤の成分によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことのある人</p> <p>2. 授乳期間中の人は本剤を使用しないでください。</p> <p>3. 本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。 (1)ニコチンパッチ製剤の使用 (2)喫煙</p> <p>4. 6カ月を超えて使用しないでください。</p> <p>次に該当する人はご相談ください。 ○医師又は歯科医師の治療を受けている人 ○他の薬を使用している人 ○高齢者及び20才未満の人 ○本人又は家族がアレルギー体質の人 ○薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人 ○次の症状のある人： 腹痛、胸痛、口内炎、のどの痛み・のどのほれ ○心臓疾患(心筋梗塞、狭心症、不整脈)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(パーズヤー病等)、高血圧、甲状腺機能障害、褐色細胞腫、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、咽頭炎、食道炎、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病の診断を受けた人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。